



台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

## 初級救護技術員訓練課程

# 生命徵象的測量與注意事項

Speaker: 黃錦源

1



台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

## 學習目標

- 認識生命徵象的定義
- 瞭解測量生命徵象的目的
- 熟悉生命徵象數值代表的意義
- 正確測量各項生命徵象數值及其注意事項

2



台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

## 八大生命徵象

- 意識(昏迷指數)
- 呼吸
- 脈搏
- 血壓
- 瞳孔
- 體溫
- 膚色血氧濃度

3



台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

## 意識

- 定義:係指大腦對外來資訊做出反應之表現。
- 評估方式
  - 清、聲、痛、否
  - 昏迷指數(Glasgow Coma Scale , GCS)

4

台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

- 清(清醒):
  - 對呼喚「先生或小姐!您哪裡不舒服?」會回答等自主性的反應。
- 聲(聲音):
  - 對呼喚或輕拍肩膀「您怎麼了?」僅有聲音(呻吟聲等)的回應或身體其他非自主性反應(如眼睛睜開、手腳或身體動了等)。
- 痛(疼痛):
  - 給予聲音刺激沒有反應，使用**捏肩膀(按壓斜方肌)**、**按壓指甲床**、**眼眶上切跡**給予**10秒以內**或**搓胸骨**(不鼓勵或有必要時)的痛刺激時，會有聲音(呻吟聲等)的回應或身體其他非自主性的反應。
- 否(無反應):
  - 對聲音及疼痛刺激皆無反應，也可稱傷病患意識昏迷。

5

台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

圖4-2-1 傷患以呼喚評估意識  
圖4-2-2 非創傷病患以呼喚評估意識  
圖4-2-3 傷患以輕拍評估意識  
圖4-2-4 非創傷病患以輕拍評估意識  
圖4-2-5 傷患以按壓指甲床評估意識  
圖4-2-6 非創傷病患以捏肩膀評估意識

6

台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

表4-2-1 昏迷指數評分表

分數	張眼反應(E)	最佳言語反應(V)	最佳運動反應(M)
1	沒有反應	沒有反應	沒有反應
2	對疼痛刺激張眼	只能發出聲音	對痛刺激肘關節及下肢皆僵直
3	對呼喚張眼	只能說出單詞	對痛刺激會有病態屈曲
4	自動張眼	回答錯誤	對痛刺激會有正常屈曲
5		回答完整且正確	會定位痛刺激
6			聽從指示
無法檢測	眼腫無法張開	有影響溝通的因素，如氣管插管、氣切或失語症等	癱瘓或其他限制四肢的因素

註1：當無法檢測(Not Testable)時，該項反應以英文縮寫NT表示，並以1分計算。

註2：定位是指傷病患的手會跨過鎖骨以上，試圖將頭肩部的痛刺激移除。正常屈曲是指傷病患的肘關節彎曲，且快速地往身體外側移動。病態屈曲是指傷病患的肘關節緩慢地彎曲，且上臂跨過胸部，前臂旋轉，手指緊握，下肢伸直。

7

台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

圖4-2-7 按壓指甲床方式  
圖4-2-8 捏肩膀(按壓斜方肌)方式  
圖4-2-9 按壓眼眶上切跡方式  
圖4-2-10 搓胸骨方式

8



9

台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

## 呼吸

- 定義:人體與外界環境進行氣體交換的過程，成人正常每分鐘呼吸速率約為10~20次。

10

台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

## 評估或測量方式

- 初步評估時
  - 以看(胸或腹部起伏)、聽(呼吸音)方式評估呼吸深、淺、快、慢及有無明顯異常呼吸音，評估時間不超過10秒
- 生命徵象的呼吸評估方式與其相似，但偏重在測量呼吸次數:
  - 每分鐘的呼吸速率(次/分) = 測量10秒鐘所呼吸的次數 × 6

圖4-3-1 以看、聽方式評估呼吸次數

11

台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

## 脈搏

- 定義:有效的心臟輸出反應在周邊動脈血管上的表現，成人正常脈搏速率每分鐘60~100次。
- 評估或測量方式及其注意事項
  - 初步評估時係以觸摸法評估頸(橈)動脈是否摸得到
  - 生命徵象的脈搏評估，則以量測數值為主

12

台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

## 數值測量方式

(一)以電子儀器測量(圖4-4-1, 4-4-2)。




圖4-4-1 以電子血壓計測量脈搏      圖4-4-2 血氣濃度分析儀測量脈搏

(二)以觸摸法量測(圖4-4-3, 4-4-4)：

$$\text{每分鐘的脈搏數(次/分)} = \text{測量10秒鐘的脈搏次數} \times 6$$



圖4-4-3 以觸摸法量測腕動脈搏      圖4-4-4 以觸摸法量測頸動脈搏

13

台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

## 血壓

• 定義：

- 循環的血液在心臟收縮及舒張時對於動脈血管所造成的壓力。
- 正常成人理想血壓為收縮壓小於120 mmHg和舒張壓小於80 mmHg。
- 當血壓低於收縮壓90 mmHg和舒張壓60 mmHg時，即可能因血壓過低造成血液無法充分流經身體各重要器官而產生不適症狀，甚至危及生命。

14

台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

## 血壓測量方式




圖4-5-1 固定壓脈帶於肘或腕關節上      圖4-5-2 按下加壓開關




圖4-5-3 關緊加壓球旁的旋轉汽門      圖4-5-4 慢慢鬆開旋轉汽門來放氣

15


台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

## 瞳孔


• 定義：

- 人類會不自主的由虹膜伸縮控制瞳孔大小，以調節光線進入瞳孔之程度，瞳孔正常為等大(2~4 mm)且對光有反應。

16




17



18



19



20

台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

## 評估或測量方式

- 評估生命徵象之膚色與評估循環中之膚色方式相同，目視是否蒼白、發紺或異常



圖4-8-1 以目視方式評估膚色

21

台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

## 血氧濃度(pulse oximetry, SpO<sub>2</sub>)

- 定義：血液中血紅素攜帶「載體」的程度，正常的情況下為氧，即血液中氧氣的濃度，一般以血氧濃度低於94%代表傷病患患有供氧不足情況。



22

台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association

## 評估或測量方式

- 將血氧濃度分析儀感測器套入傷病患手指上(通常為食指或中指)，即可量測血氧濃度數值(%), 然後記錄血氧濃度分析儀所顯示之數值
- 陷阱：
  - 傷病患因天氣冷而末端肢體冰冷(血液循環不好)
  - 嚴重貧血
  - 高海拔(低氧氣分壓)
  - 同肢體量測血壓時
  - 一氧化碳中毒(血紅素載體異常)等。



圖4-9-1 測量血氧濃度數值

23

台灣新視野緊急救護協會  
Taiwan New Vision Emergency Medical Association



Question?



24



25